

鉄の種類が唯一違う！

第2類医薬品



胃切除術後貧血・鉄欠乏性貧血・溶血性貧血・巨赤芽球性貧血・再生不良性貧血・腎性貧血など・・・、貧血の改善に効果のある**フマル酸第一鉄**や造血効果のある**ビタミンB12**と**葉酸**を配合した**造血薬**です。

一般の鉄欠乏及び諸疾患に伴う貧血。妊娠時の貧血。小児の栄養障害による貧血。虚弱児・腺病質児。発育不良時の造血及び栄養補給。寄生虫性貧血。などに!!



フマル酸第一鉄・硫酸銅・硫酸コバルト・硫酸マンガン・葉酸・ピリドキシン塩酸塩・シアノコバラミン・アスコルビン酸・トコフェロール酢酸エステル・銅クロロフィリンカリウム・銅クロロフィリンナトリウム



葉酸

B12

1回大人(15歳以上)・・・
2～3錠を2回
7～14歳・・・1錠を2回
7歳未満は服用しないで下さい！

1回の服用量を食後に服用

フマル酸第一鉄・貧血の改善
ビタミンB12・・・造血作用
銅クロロフィリンカリウムと
銅クロロフィリンナトリウム・胃痛を軽減！
ビタミンC・・・鉄分の吸収を高める

鉄含有量が多い！ 吸収を考慮した設計

鉄剤は吸収と継続を考えることが大切!!

詳しくは、店頭薬剤師・
管理栄養士に!

